

Prophylaxie du paludisme 2017

Recommandations du Comité d'experts en médecine des voyages (CEMV / Suisse).

- 1.) Il est recommandé de se protéger contre les piqûres de moustiques dans toutes les zones d'endémie, y compris celles où le risque de transmission du paludisme est jugé minime*.
- 2.) La prophylaxie médicamenteuse et/ou le traitement d'urgence sont prescrits en fonction de la destination de voyage*.

* une liste détaillée des pays est régulièrement publiée dans le Bulletin de l'Office fédéral de la santé publique OFSP (document: Santé-voyages: Vaccinations et mesures antipaludiques [<http://www.bag.admin.ch>]).

P	Atovaquone/proguanil APP , méfloquine MP ou doxycycline DP en prophylaxie médicamenteuse
Ps (T)	Prophylaxie médicamenteuse (saisonnaire): Atovaquone/proguanil APP , méfloquine MP ou doxycycline DP Traitement d'urgence avec artéméter/luméfantrine ALT ou atovaquone / proguanil APT pour des situations particulières (consulter la liste de l'OFSP*)
T	Pas de prophylaxie médicamenteuse Artéméter/luméfantrine ALT ou atovaquone/proguanil APT en traitement d'urgence
(T)	Pas de prophylaxie médicamenteuse Traitement d'urgence avec artéméter/luméfantrine ALT ou atovaquone / proguanil APT pour des situations particulières (consulter la liste de l'OFSP*)

